

Non avvio e sospensione del trattamento dialitico

Studio osservazionale del fenomeno sul territorio riminese

M. Sgreccia, C. Tini

Di cosa parliamo

SOSPENSIONE DELLA DIALISI:

cessazione del trattamento dialitico in corso

RIFIUTO o OMISSIONE o NON AVVIO:

decisione di non iniziare la dialisi

SOSPENSIONE DELLA DIALISI

Avviene per il fallimento del tentativo di migliorare la qualità della vita con la dialisi per il deterioramento neurologico e mentale (43%) o per le complicanze mediche intercorse (35%) (come, la malattia neoplastica, la necessità di intervento chirurgico, la gastropatia, la neuropatia diabetica e l'incremento del dolore fisico) o per generici altri motivi (18%), o per il fallimento dell'accesso vascolare (4%).

RIFIUTO o OMISSIONE o NON AVVIO

Si parla invece di “rifiuto” od “omissione” quando si decide di non iniziare la dialisi, generalmente per i seguenti motivi: l’età avanzata, la completa perdita di autonomia, la patologia arteriosclerotica estesa, la demenza grave, il cancro metastatico e la richiesta del paziente.

Meinero S., Alloatti S., Triolo G., Guarnieri A., Inguaggiato P., Bainotti S., Formica M. Non avvio e sospensione del trattamento dialitico cronico nell’adulto: considerazioni cliniche, relazionali, bioetiche e legislative.

Giornale Italiano di Nefrologia, 2007; Anno 21, N. 1: 43-50.

Di cosa parliamo

In Italia, la percentuale dei fenomeni di rifiuto o sospensione della dialisi è minore dell'1%.

Molto inferiore rispetto alle percentuali di Canada (17%), Stati Uniti (22%), Nuova Zelanda (22%) e Australia (27%)




Dati del territorio riminese riguardo al fenomeno non avvio e sospensione

anno 2007 vs triennio 2012 - 2014


Non Avvio

Non avvii del 2007 : nessuno


Non avvio del trattamento 2012



Non avvio del trattamento 2013




Non avvio del trattamento 2014




Sospensione del trattamento


Sospensione del trattamento 2007




Sospensione del trattamento 2012



Sospensione del trattamento 2013




Sospensione del trattamento 2014




I luoghi del morire

Luogo del decesso 2007




I luoghi del morire

Luogo del decesso 2014




Età dialitica al momento del decesso

Età dialitica 2007



Età dialitica al momento del decesso

Età dialitica 2014



Conclusioni

- La riflessione inevitabile è che forse in alcuni casi tutta l'assistenza prestata possa aver avuto poco senso; ma come in tutte le considerazioni che coinvolgono l'etica, che comportano il confrontarsi sulla qualità di vita e sulla morte, non si arriva a stabilire qualcosa di definitivo; piuttosto si aprono altre domande.

Grazie per l'attenzione